

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

2 AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pallasier
63034 Clermont Ferrand Cedex

(73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE



JA

Grandes Cultures

N°32

Le 9 Octobre 1984

COLZA

STADE

- semis début Septembre.....: 2 à 3 feuilles (B2 à B3)
- semis de fin Septembre.....: levée (A) à 2 feuilles (B2)

GROSSE ALTISE

Les captures sont peu importantes dans la plupart de nos postes de piégeage.

Il est malgré tout nécessaire de suivre l'évolution du nombre de pieds présentant des morsures.

*Intervenir dès que trois plantes sur dix présentent des morsures.
Consulter notre Bulletin n° 30.*

LIMACES

La période pluvieuse a été favorable aux limaces. Plusieurs parcelles présentent des attaques (lacération des feuilles).

En cas de nécessité, un traitement, en plein, avec un granulé anti-limaces est recommandé.

DESHERBAGE DE POST-LEVEE

De nombreuses parcelles de colza de l'Allier présentent des infestations parfois très importantes de repousses de céréales, particulièrement dans les zones où les céréales ont subi des orages de grêle durant l'été.

Un traitement de rattrapage est à effectuer rapidement en utilisant une spécialité à action foliaire comme :

- FUSILADE, FERVINAL ou FERVIN (cf. notre Bulletin n° 30 du 18 Septembre 1984).

N. B. : Il est préférable d'intervenir sur des graminées avant le stade fin tallage pour obtenir une meilleure efficacité.

h° 50 47 245

1984: n° 32. 37 49 33

P.11.

CEREALES

DESHERBAGE DE PRE-LEVEE

Cette technique est recommandée sur les parcelles :

- en semis précoces
- où le salissement est important
- où l'on pénètre difficilement en fin d'hiver (SOLOGNE, BOCAGE, COMBRAILLES, etc...).

. AVANTAGES

- Bonne efficacité sur les graminées.
- Peu de problème de phytotoxicité.
- Facilité de traitement.

. LIMITES

- Il est parfois difficile de prévoir la composition et l'évolution de la flore.
- Une intervention de post-levée peut s'avérer nécessaire (dicotylédones, folle-avoine).

Le choix de l'herbicide se fera donc en fonction de la flore habituellement rencontrée dans la parcelle (graminées mais aussi dicotylédones).

Consulter le tableau ci-joint.

REMARQUES

- Attention aux variétés de blé sensibles au Chlortoluron.

Abo, Aiglon, Alto, Aquila, Arminda, Aviso, Carat, Cargo, Corin, Eloï, Feuvert, Heima, Hobbit, Kinsman, Magister, Maris Hunstman, Nautica, Pernel, Rémois, Riol, Rotonde, Sabre, Scipion, Valmy, Vasco.

- L'emploi du NEBURON seul est déconseillé en sols filtrants (SOLOGNE...) compte-tenu des problèmes de phytotoxicité.

DESHERBAGE D'AUTOMNE DES CEREALES

SPECIALITES	UTILISATION				STADE D'APPLICATION					DOSE SC/HA	EFFICACITE HERBICIDE								
	Blé	Orge	Seigle	Triticale	Semis	Levée	1 feuille	3 feuilles	1 talle		Folle avoine	Ray-Grass	pâturin	Vulpin	Agrostis	Matricaire	Véronique	Pensée	Stellaire
AVADEX BW AVADEX BW granulé	x	x								3,5 l 20 à 25 kg	+	+	++	++	+				
Spécialités à base de néburon	x	x								4 à 7 kg ou 6 à 10 l				++	++	++		+	
TOK E 25 TOK WP 50	x		x							4 à 5 kg 8 à 12 l	++(1)	++	++	++	++		++		
HERBALT HERBALT S	x x		x	x						6 à 8 kg		++	++	++	++	++	++	+	++
TREPLIK	x	x	x	x						4 à 5 kg		+	++	++	++	++	++	++	++
NORLAN T	x	x								5 l			++	++	++	++	+		++
DINOGRANE SP	x									8 kg		++	++	++	++	++	++	++	++
ACORIT LL	x	x								6 kg		+	++	++	++	++	++	+	++
WINNER	x									5 kg		+	++	++	++	++	++	+	++
PRODIG Flo	x	x	x							7 l	++(1)	+	++	++	++	++		+	++
TRIBUNIL	x									4 kg			++	++	++	++		+	++
DICURAN autosuspensible DICURAN microsec	x	x		(x)						4 à 6 l 10 à 15 kg	+	++	++	++	++	++			+
IGRANE TERATRYNE	x									5 l		+	++	++	++	+	+		++
TOLION 303	x		x							7 l		++	++	++	++	++(1)	++		++
CHANDOR TERSIPLNE FERMAX	x x x	x x x	x	x						4 l 4 l 4 l		+	++	++	++	++	++	+	++
TRAPAN	x	x	x	x						2,5 kg		+	++	++	++	++	++	+	++
ESCURAN		x								5 l	+	++	++	++	++	++	++		+
BOCHAMP	x	x		(x)						6 l		+	++	++	++	++	++	+	++
FOXTO	x									7,5 l		+	++	++	++	++	++	++	++
GLEAN T TRILIXON	x x									4 kg		++	++	++	++	++	++	+	++

L E G E N D E

=====



traitement possible



possible, mais risque de phytotoxicité

Pour le Triticale : pas de spécialités homologuées



possibilité de traitement
pendant cette période



risque de phytotoxicité en cas de froid



bonne efficacité



efficacité moyenne



mauvaise efficacité



efficace sur levée d'automne